

Přednáška 7

Analytická geometrie v n -rozměrném euklidovském prostoru E_n

Osnova přednášky

1. Vzdálenost bodů v E_n , metrika.
2. Orientovaná úsečka \overrightarrow{AB} , vázané vektory.
3. Úhel mezi vázanými vektory, kosinová věta.
4. Paralelní přenos vázaných vektorů.
5. Vektorový prostor V_n volných vektorů.
6. Délka vektoru $\mathbf{v} \in V_n$, norma vektoru.
7. Skalární součin ve vektorovém prostoru V_n .
8. Úhel mezi vektory, ortogonální vektory.
9. Afinní Euklidovský prostor E_n .
10. Kartézský systém souřadnic v E_n .
11. Souřadnice vektoru $\mathbf{v} \in V_n$ vzhledem ke kartézskému systému souřadnic.
12. Skalární součin a délka vektoru pomocí souřadnic.
13. Kartézské souřadnice bodu $\mathbf{x} \in E_n$.
14. Vzdálenost bodů $X, Y \in E_n$ pomocí jejich kartézských souřadnic.
15. k -rozměrná nadrovina \mathcal{L}_k v E_n a její parametrické rovnice.
16. Parametrické rovnice přímky a roviny.
17. Popis $(n - 1)$ -rozměrné nadroviny v E_n pomocí normálového vektoru.
18. Vyjádření vektoru \mathbf{n} , který je kolmý na $(n - 1)$ vektorů $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$.
19. Vektorový součin vektorů \mathbf{u} a \mathbf{v} v třírozměrném prostoru.
20. Vlastnosti vektorového součinu $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
21. Popis k -rozměrné nadroviny v E_n pomocí řešení soustavy rovnic.
22. Normálové vektory a normálové prostory ke k -rozměrné nadrovině.
23. Vztah mezi parametrickým popisem k -rozměrné nadroviny a jejím popisem pomocí řešení soustavy rovnic.
24. Zobrazení intervalu $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ do \mathbb{R}^n jako parametrické rovnice křivky.
25. Diferenciál a derivace zobrazení $\mathbf{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$, kde $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$.
26. Tečný vektor a rovnice tečny ke křivce v \mathbb{R}^n dané parametrickými rovnicemi.
27. Průměrná a okamžitá rychlost bodu, zrychlení bodu.

Většina matematických konstrukcí, které budeme dělat, velmi úzce souvisí s geometrií. V podstatě budeme popisovat body n -rozměrného prostoru pomocí uspořádaných n -tic reálných čísel, tj. prvky \mathbb{R}^n , a přepisovat geometrické vztahy pomocí těchto n -tic. Tento postup se nazývá analytická geometrie.

V mnohých oborech se potřebují takové konstrukce v abstraktním n -rozměrném prostoru. Proto budu na přednášce používat n -rozměrný prostor. Abstraktní matematické konstrukce, které budeme dělat, jsou zobecněním geometrických konstrukcí v dvou, resp. třírozměrném euklidovském prostoru E_2 , resp. E_3 . Proto doporučuji, abyste si všechno představovali v obvyklém třírozměrném prostoru.

Geometrické vlastnosti euklidovského prostoru E_n

Pro každé dva body A, B euklidovského prostoru E_n je definována jejich vzdálenost $d(A, B) \in \langle 0, \infty \rangle$, kterou v dvou nebo tří rozměrném prostoru můžeme změřit například pravítkem. Vzdálenost bodů $A, B \in E_n$ má následující vlastnosti:

1. pro každé $A, B \in E_n$ je $d(A, B) = d(B, A)$;
2. $d(A, B) = 0$ právě tehdy, když $A = B$;
3. pro každé tři body $A, B, C \in E_n$ platí *trojúhelníková nerovnost*

$$d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B).$$

Poznámka: V matematice se pojem vzdálenosti zobecňuje na pojem *metriky*. Metrika na množině M je funkce $d : M \times M \rightarrow \langle 0, \infty \rangle$, která má vlastnosti 1, 2 a 3. Množina M , na které je definována metrika, se nazývá *metrický prostor*.

Pro dva body $A, B \in E_n$ definujeme orientovanou úsečku z bodu A do bodu B , kterou označíme \overrightarrow{AB} . Pro orientovanou úsečku \overrightarrow{AB} definujeme její délku jako vzdálenost bodů A, B , tj. jako $d(A, B)$.

Je-li \overrightarrow{AB} orientovaná úsečka z bodu A do bodu B a \overrightarrow{BC} orientovaná úsečka z bodu B do bodu C , definujeme jejich součet $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ jako orientovanou úsečku z bodu A do bodu C .

Pro orientovanou úsečku \overrightarrow{AB} a $c \in \mathbb{R}$ označíme $c(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AC}$ orientovanou úsečku z bodu A do bodu C , který leží na přímce dané body A a B a jehož vzdálenost od bodu A je $|c|d(A, B)$. Přitom je-li $c > 0$ leží bod C na polopřímce s počátečním bodem A , na které leží bod B , kdežto pro $c < 0$ leží na opačné polopřímce.

Poznámka: Orientované úsečky \overrightarrow{AB} se často nazývají *vázané vektory*. Protože není definován součet libovolných vázaných vektorů, není tato množina vektorový prostor.

Další geometrický pojem, který je definován v prostoru E_n , je úhel mezi orientovanými úsečkami, které začínají ve stejném bodě. Každé tři navzájem různé body A, B a C tvoří trojúhelník $\triangle ABC$ nebo leží na jedné přímce. Jestliže označíme délky jeho stran $a = d(B, C)$, $b = d(A, C)$ a $c = d(A, B)$ a $\gamma \in \langle 0, \pi \rangle$ úhel při vrcholu C , platí v E_n kosinová věta

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

kde γ se nazývá úhel mezi orientovanými úsečkami \overrightarrow{CA} a \overrightarrow{CB} .

V euklidovském prostoru je podstatné, že takové orientované úsečky lze paralelně (rovnoběžně) posouvat z bodu do bodu, tj. že pro každý bod C umíme orientovanou úsečku \overrightarrow{AB} s počátečním bodem A posunout tak, abychom získali právě jednu orientovanou úsečku \overrightarrow{CD} s počátečním bodem C , která odpovídá orientované úsečce \overrightarrow{AB} . Navíc paralelní posunutí nemění délku vázaného vektoru ani úhel, který svírají dva vázané vektory, které začínají ve stejném bodě.

Nejdůležitější vlastnost euklidovského prostoru E_n je, že paralelní posunutí vektoru nezávisí na tom, po jakým způsobem přenášíme vektor \overrightarrow{AB} z bodu A do bodu C . Konkrétně, pokud přeneseme vektor \overrightarrow{AB} do bodu C přímo (po nejkratší dráze) nebo ho nejprve přeneseme do bodu \hat{C} a pak z bodu \hat{C} do bodu C , dostaneme v bodě C stejný vázaný vektor. Tato zdánlivě samozřejmá vlastnost paralelního přenosu neplatí například na kulové ploše a vede k tzv. neeuklidovské geometrii.

Paralelní posunutí umožňuje zavést pojem volného vektoru \mathbf{v} . To je v podstatě vektor, který odpovídá celé množině vázaných vektorů, které získáme paralelním posunutím z jednoho daného vázaného vektoru \overrightarrow{AB} . Množinu všech volných vektorů budeme značit V_n .

Poznámka. Matematicky se takové ztotožnění formuluje tak, že na množině vázaných vektorů definujeme relaci $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$ právě tehdy, když vázaný vektor \overrightarrow{CD} vznikne z vázaného vektoru \overrightarrow{AB} paralelním posunutím. Ukazuje se, že tato relace je reflexivní, tj. pro každý vázaný vektor \overrightarrow{AB} je $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{AB}$, symetrická, tj. pokud je $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$, pak je $\overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{AB}$, a tranzitivní, tj. pokud je $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$ a $\overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{EF}$, je $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{EF}$. Taková relace se v matematice nazývá *relace ekvivalence*. Relace ekvivalence rozděluje množinu všech vázaných vektorů na množinu *tříd ekvivalence*, tj. podmnožin vzájemně ekvivalentních prvků. Tyto třídy ekvivalence jsou navzájem disjunktní, tj. pro dvě třídy ekvivalence T_1 a T_2 buď platí $T_1 = T_2$ nebo $T_1 \cap T_2 = \emptyset$. To nám umožňuje definovat množinu V_n , jejíž prvky jsou třídy ekvivalence, tzv. volné vektory \mathbf{v} .

Mezi prvky prostoru V_n lze definovat operaci sčítání a násobení reálným číslem. Přesněji, jsou-li \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 prvky V_n , vybereme vázaný vektor \overrightarrow{AB} , který patří do třídy \mathbf{v}_1 a vázaný vektor \overrightarrow{BC} , který je prvkem třídy \mathbf{v}_2 . Součet těchto vektorů $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ je pak třída, která obsahuje vázaný vektor $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. Podobně definujeme násobení reálným číslem. Lze ukázat, že tato definice nezávisí na výběru reprezentantů \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 . Navíc je zřejmé, že vázaný vektor \overrightarrow{AA} reprezentuje nulový vektor $\mathbf{0}$. S těmito operacemi tvoří V_n vektorový prostor.

Pro euklidovský prostor E_n je dimenze prostoru V_n , tj. počet lineárně nezávislých vektorů, které generují V_n , rovna n .

Protože paralelní posunutí nemění délku vázaného vektoru, mají všechny vázané vektory ve třídě \mathbf{v} stejnou délku. Tuto délku označíme $\|\mathbf{v}\|$ a budeme ji nazývat délkou vektoru \mathbf{v} . Z vlastností 1, 2 a 3 vzdálenosti bodů plyne, že pro délku vektor $\|\mathbf{v}\|$ platí

1. pro každé $\mathbf{v} \in V_n$ je $\|\mathbf{v}\| \geq 0$. Přitom z rovnosti $\|\mathbf{v}\| = 0$ plyne $\mathbf{v} = \mathbf{0}$;
2. pro každé $\mathbf{v} \in V_n$ a $c \in \mathbb{R}$ je $\|c\mathbf{v}\| = |c| \|\mathbf{v}\|$;

3. pro každé $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V_n$ platí trojúhelníková nerovnost

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|.$$

Poznámka. Funkce ν na vektorovém prostoru V , pro kterou platí 1, 2 a 3, se nazývá norma vektoru a vektorový prostor V , na kterém je definována norma, se nazývá *normovaný vektorový prostor*. Jestliže je V normovaný vektorový prostor v normou ν , můžeme na V definovat metriku $d(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \nu(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)$.

Protože paralelní posunutí nemění úhel, který svírají dva vázané vektory \overrightarrow{CA} a \overrightarrow{CB} , lze tento úhel najít mezi volnými vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 z V_n , které těmto vektorům odpovídají. Pro určení úhlu mezi vektory ve vektorovém prostoru V_n slouží operace, která se nazývá skalární součin. *Skalární součin* přiřazuje každým dvěma vektorům $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V_n$ reálné číslo, které budeme značit $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$. Pro toto zobrazení $V_n \times V_n \rightarrow \mathbb{R}$ platí:

1. pro každé $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V_n$ a $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ je

$$(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{v}_3 = c_1(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3) + c_2(\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3);$$

2. pro každé $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V_n$ je $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1$;

3. pro každé $\mathbf{v} \in V_n$ je $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \geq 0$;

4. z rovnosti $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ plyne $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

V euklidovském prostoru E_n je vztahem $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \|\mathbf{v}\|$ definována délka vektoru \mathbf{v} v prostoru V_n , a tedy i délka vázaného vektoru \overrightarrow{AB} , který vektor \mathbf{v} reprezentuje.

Poznámka. V obecném vektorovém prostoru V , ve kterém je definován skalární součin, platí následující tzv. *Schwarzova*, nerovnost.

Věta (*Schwarzova nerovnost*). Pro každé dva vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ platí nerovnost

$$|\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2| \leq \|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|.$$

Přitom rovnost nastává pouze tehdy, když jsou vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 lineárně závislé.

DŮKAZ: Jestliže jsou vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 lineárně závislé, je buď $\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ nebo $\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_2$, kde $c \in \mathbb{R}$. Příným výpočtem se snadno přesvědčíme, že v tomto případě platí v uvedeném vztahu rovnost.

Nechť jsou vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 lineárně nezávislé. Z toho plyne, že $\mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$ a tedy $\|\mathbf{v}_2\| > 0$. Pro každé $t \in \mathbb{R}$ vektor $\mathbf{v}_1 - t\mathbf{v}_2$ nenulový. Proto je pro každé $t \in \mathbb{R}$

$$F(t) = (\mathbf{v}_1 - t\mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_1 - t\mathbf{v}_2) = \|\mathbf{v}_1\|^2 - 2t(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) + t^2\|\mathbf{v}_2\|^2 > 0.$$

Pro dané \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 je $F(t)$ kladná kvadratická funkce proměnné t , která nabývá minimum v bodě t_0 , pro který platí

$$F'(t_0) = -2(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) + 2t_0\|\mathbf{v}_2\|^2 = 0, \quad \text{tj.} \quad t_0 = \frac{(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2)}{\|\mathbf{v}_2\|^2}.$$

Ale v tomto bodě je

$$F(t_0) = \|\mathbf{v}_1\|^2 - \frac{(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2)^2}{\|\mathbf{v}_2\|^2} > 0.$$

To je právě uvedená Schwarzova nerovnost.

Ze Schwarzovy nerovnosti plyne v obecném vektorovém prostoru se skalárním součinem trojúhelníková nerovnost

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|.$$

Abychom uvedený vztah dokázali, uvažujeme

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\|^2 &= (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \|\mathbf{v}_1\|^2 + 2(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) + \|\mathbf{v}_2\|^2 \leq \\ &\leq \|\mathbf{v}_1\|^2 + 2\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\| + \|\mathbf{v}_2\|^2 = (\|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|)^2, \end{aligned}$$

kde jsme použili Schwarzovu nerovnost.

V každém vektorovém prostoru V se skalárním součinem definuje vztah $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ normu. Obecně nemusí být norma ve vektorovém prostoru definována skalárním součinem, ale ve vektorovém prostoru V_n , který odpovídá euklidovskému prostoru E_n , tomu tak je.

Nyní můžeme dát geometrickou interpretaci skalárního součinu. Uvažujme dva nenulové vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 z prostoru V_n . Nechtě jsou tyto vektory reprezentovány vázanými vektory \overrightarrow{CB} a \overrightarrow{CA} . Pak vektor $\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ lze reprezentovat vázaným vektorem \overrightarrow{BA} . V prostoru E_n jsou body A , B a C vrcholy trojúhelníka se stranami $a = d(C, B) = \|\mathbf{v}_1\|$, $b = d(C, A) = \|\mathbf{v}_2\|$ a $c = d(B, A) = \|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\|$. Podle definice skalárního součinu platí vztah

$$c^2 = \|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\|^2 = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2 - 2(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) = a^2 + b^2 - 2(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2).$$

Jestliže srovnáme tento vztah s kosinovou větou $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$, kde γ je úhel v trojúhelníku při vrcholu C , dostaneme pro hodnotu skalárního součinu výraz

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\| \cos \gamma,$$

kde γ je úhel mezi vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 . Tohoto vztahu se používá pro výpočet úhlu mezi dvěma nenulovými vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 ve V_n , resp. v E_n .

Z uvedeného vztahu je zřejmé, že vektory \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2 jsou kolmé, často se říká *ortogonální*, právě tehdy, když $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.

Na závěr shrneme naše úvahy:

Euklidovský prostor E_n je vlastně dvojice (E_n, V_n) , kde E_n je množina bodů a V_n je n -rozměrný vektorový prostor se skalárním součinem.

Každým dvěma bodům $A, B \in E_n$ je přiřazen právě jeden vektor $\mathbf{v} \in V_n$, konkrétně vektor, který odpovídá vázanému vektoru \overrightarrow{AB} .

Každému bodu $A \in E_n$ a vektoru $\mathbf{v} \in V_n$ je přiřazen právě jeden bod $B \in E_n$, konkrétně bod B takový, že vázaný vektor \overrightarrow{AB} odpovídá vektoru \mathbf{v} .

Poznámka. Tato zobrazení musí mít jisté vlastnosti, které zde nebudeme vypisovat. Jde v podstatě o to, abychom pomocí souřadnic mohli pro každé dva body $A, B \in E_n$ a vektor $\mathbf{v} \in V_n$ psát $\overrightarrow{AB} = (B - A) \in V_n$ a $B = A + \mathbf{v}$.

Poznámka. S vektorovými prostory V jste se seznámili na přednášce z lineární algebry. Na rozdíl od vektorového prostoru je euklidovský prostor E_n vlastně dvojice (E_n, V_n) , kde E_n je množina a V_n n -dimenzionální vektorový prostor, pro kterou jsou definována uvedená zobrazení. V matematice se struktura takového typu nazývá *afinní prostor* modelovaný vektorovým prostorem

V_n . Rozdíl je v tom, že ve vektorovém prostoru je dán speciální prvek, nulový vektor $\mathbf{0}$, kdežto v afinním prostoru takový speciální prvek není.

Tedy euklidovský prostor E_n je afinní prostor, který je modelovaný n -dimenzionálním vektorovým prostorem se skalárním součinem.

Kartézské souřadnice v prostoru E_n

Všechny geometrické pojmy v euklidovském prostoru E_n lze formulovat pouze pomocí uvedených operací mezi body prostoru E_n a vektory vektorového prostoru V_n , který moduluje E_n . Při konkrétních výpočtech ale potřebujeme popsat tyto objekty pomocí množiny čísel. Proto se v těchto prostorech zavádějí souřadnice. My budeme používat nejjednodušší, tzv. kartézský systém souřadnic, který nyní zavedeme.

V prostoru E_n vybereme bod P , který budeme nazývat *počátek souřadnic*. Každému bodu $X \in E_n$ je pak jednoznačně přiřazen vázaný vektor \overrightarrow{PX} . Tento vektor je reprezentantem volného vektoru $(X - P) = \mathbf{x} \in V_n$.

V prostoru V_n zvolíme bázi, která je tvořena jednotkovými ortogonálními vektory \mathbf{e}_k , kde $k = 1, 2, \dots, n$, kde $n = \dim V_n$. Pro vektory takové báze platí

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k = \delta_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{pro } i \neq k, \\ 1 & \text{pro } i = k. \end{cases}$$

Zde zavedený symbol δ_{ik} se nazývá *Kroneckerovo delta* a poměrně často se používá při výpočtech.

Každá taková uspořádaná množina $\mathfrak{S} = (P; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ se nazývá *kartézský souřadný systém* v E_n .

Poznámka. Slovo kartézský zde vyjadřuje, že jsou vektory \mathbf{e}_k *ortonormální*, tj. navzájem kolmé, a jednotkové. Obecně lze za systém vektorů \mathbf{e}_k zvolit libovolnou bázi prostoru V_n , ale v tom případě budou konkrétní výpočty složitější.

Protože vektory \mathbf{e}_k tvoří bázi v prostoru V_n , lze každý vektor $\mathbf{v} \in V_n$ vyjádřit právě jedním způsobem ve tvaru

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + \dots + v_n \mathbf{e}_n = \sum_{k=1}^n v_k \mathbf{e}_k,$$

kde $v_k \in \mathbb{R}$. Reálná čísla v_k se nazývají souřadnice vektoru $\mathbf{v} \in V_n$ v bázi \mathbf{e}_k . Pro danou bázi \mathbf{e}_k prostoru V_n jsme takto dostali zobrazení $V_n \rightarrow \mathbb{R}^n$, které každému vektoru \mathbf{v} přiřazuje uspořádanou n -tici reálných čísel, jeho souřadnic. Proto se pro danou bázi zapisuje vektor \mathbf{v} jako

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

kde v_k jsou souřadnice vektoru \mathbf{v} . Všimněte si toho, že souřadnice vektorů báze jsou v tomto zápise $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, \dots , $\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$.

Výhoda volby kartézského systému souřadnic spočívá v tom, že pro skalární součin vektoru \mathbf{v} s vektorem báze \mathbf{e}_k platí

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_k = \sum_{i=1}^n v_i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k = \sum_{i=1}^n v_i \delta_{ik} = v_k.$$

To znamená, že souřadnice vektoru \mathbf{v} jsou kolmé průměty vektoru \mathbf{v} do směří \mathbf{e}_k .

Navíc pro skalární součin vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dostaneme

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \left(\sum_{i=1}^n u_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n v_k \mathbf{e}_k \right) = \sum_{i,k=1}^n u_i v_k \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k = \sum_{i,k=1}^n u_i v_k \delta_{ik} = \sum_{k=1}^n u_k v_k. \quad (1)$$

Speciálně pro délku vektoru \mathbf{v} máme vztah

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n v_k^2, \quad \text{tj.} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2},$$

který odpovídá Pythagorově větě.

Uvažujme pevně daný souřadný systém $\mathfrak{S} = (P; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ v E_n . Každému bodu $X \in E_n$ přiřadíme vázaný vektor \overrightarrow{PX} . Tomuto vázanému vektoru odpovídá volný vektor $(X - P) = \mathbf{x}$ a volnému vektoru \mathbf{x} jeho souřadnice x_k . Symbolicky lze tuto posloupnost zobrazení zapsat jako

$$X \mapsto \overrightarrow{PX} \mapsto X - P = \mathbf{x} \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Tímto způsobem pro daný souřadný systém \mathfrak{S} přiřadíme každému bodu $X \in E_n$ uspořádanou n -tici reálných čísel, tj. prvek prostoru \mathbb{R}^n , tak zvaných souřadnic bodu X . Abychom vyjádřili rozdíl mezi souřadnicemi bodu X prostoru E_n , respektive vázanými vektory \overrightarrow{PX} a volnými vektory \mathbf{v} , budeme toto přiřazení symbolicky psát jako

$$X \equiv \mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n].$$

Podíváme se trochu podrobněji na geometrický význam uvedené konstrukce souřadnic bodu z hlediska euklidovského prostoru E_n . Volbou bodu $P \in E_n$ jsme vlastně zvolili počátek souřadného systému. Pro samotný bod P je $P - P = \mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$, tj. souřadnice počátku P jsou $\mathbf{p} = [0, 0, \dots, 0]$

Volné jednotkové navzájem ortogonální vektory báze \mathbf{e}_k odpovídají v prostoru E_n výběru bodů $X_k = P + \mathbf{e}_k$ v E_n takových že vázané vektory $\overrightarrow{PX_k}$, které začínají v bodě P jsou jednotkové a navzájem kolmé. Poznamenejme, že souřadnice těchto bodu jsou $X_k \equiv \mathbf{x}_k = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$, kde 1 je právě na k -tém místě. Vázané vektory $\overrightarrow{PX_k}$ určují v E_n vzájemně kolmé orientované přímky, které se nazývají souřadnicové osy. Pro daný bod $X \in E_n$ pak sestrojíme jeho kolmé průměty na souřadnicové osy a souřadnice x_k bodu X jsou orientované vzdálenosti těchto průmětů od bodu P , tj. $x_k > 0$, pokud průmět leží na polopřímce PX_k s počátkem v bodě P , a $x_k < 0$ v opačném případě.

Jestliže jsou X a Y dva body v E_n , platí pro každé $P \in E_n$ mezi vázanými vektory vztah $\overrightarrow{PY} = \overrightarrow{PX} + \overrightarrow{XY}$. Jestliže označíme $\mathbf{v} = Y - X \in V_n$ vektor, který odpovídá vázanému vektoru \overrightarrow{XY} , lze uvedený vztah zapsat jako

$$\mathbf{v} = Y - X = (Y - P) - (X - P) = \mathbf{y} - \mathbf{x}.$$

Tedy jestliže jsou souřadnice bodu $X \equiv \mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ a bodu $Y \equiv [y_1, y_2, \dots, y_n]$ má vektor $\mathbf{v} = Y - X$ souřadnice

$$\mathbf{v} = Y - X = (y_1 - x_1, y_2 - x_2, \dots, y_n - x_n).$$

Podobně dostaneme pro souřadnice bodu $Y = X + \mathbf{v}$ vztah

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n] = \mathbf{x} + \mathbf{v} = [x_1 + v_1, x_2 + v_2, \dots, x_n + v_n],$$

kde $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ jsou souřadnice bodu $X \in E_n$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ jsou souřadnice vektoru $\mathbf{v} \in V_n$.

Vzdálenost bodů X a Y v E_n definovali jako délku vázaného vektoru \overrightarrow{XY} . Jestliže tedy jsou souřadnice bodů X a Y rovny $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ a $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]$, je vzdálenost těchto bodů dána vztahem

$$d(X, Y) = \|Y - X\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - x_k)^2}.$$

Poznámka. Důvod, proč se souřadnice v prostoru E_n zavádí poměrně složitým způsobem, i když intuitivní zavedení souřadnic je z geometrického hlediska zcela zřejmé, je v tom, že souřadnice bodů závisí na volbě souřadného systému \mathfrak{S} . Uvědomte si, že bod $X \in E_n$ je zcela konkrétní objekt, kdežto jeho souřadnice jsou pouze pomocný pojem. Jestliže má bod X vzhledem k souřadnému systému \mathfrak{S} souřadnice $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ a vzhledem k jinému souřadnicovému systému \mathfrak{S}' souřadnice $\mathbf{x}' = [x'_1, x'_2, \dots, x'_n]$, umožňuje uvedená konstrukce najít poměrně jednoduše vztah mezi těmito dvěma popisy. Pomocí těchto vztahů mezi souřadnicemi v různých kartezských systémech souřadnic se definují objekty různého typu jako například skaláry, vektory, tenzory atd.

Lineární útvary v E_n

Zatím jsme se zabývali popisem bodů v euklidovském prostoru E_n . Dalšími velmi jednoduchými útvary v prostoru E_n jsou lineární útvary, tzv. k -rozměrné nadroviny v E_n . Ty jsou zobecnění pojmů přímka a rovina v dvou- nebo tří-rozměrném prostoru.

Nechť je dán bod $A \in E_n$ a k lineárně nezávislých vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V_n$. k -rozměrnou nadrovinou \mathcal{L}_k v E_n , která prochází bodem A a je rovnoběžná s vektory \mathbf{v}_i , $i = 1, 2, \dots, k$, nazýváme množinu všech bodů $X \in E_n$ takových, že vektor $X - A$ je lineární kombinací vektorů \mathbf{v}_i .

Toto tvrzení lze zapsat tak, že prvek $X \in E_n$ je prvkem nadroviny \mathcal{L}_k právě tehdy, když existují reálná čísla t_1, t_2, \dots, t_k taková, že

$$X - A = \mathbf{v}_1 t_1 + \mathbf{v}_2 t_2 + \dots + \mathbf{v}_k t_k = \sum_{i=1}^k \mathbf{v}_i t_i. \quad (2)$$

Poznámka. 0-rozměrné nadroviny jsou body, jedno-rozměrné nadroviny se nazývají přímky a pro 2-rozměrné nadroviny používáme, zejména v E_3 , název rovina.

Rovnice (2) popisuje nadrovinu \mathcal{L}_k bez ohledu na výběr souřadného systému \mathfrak{S} v E_n . Jestliže v E_n pevně zvolíme souřadný systém $\mathfrak{S} = (P; \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ a souřadnice bodu A a vektoru \mathbf{v}_i jsou v tomto souřadném systému

$$\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n], \quad \mathbf{v}_i = (v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,n}), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

dává rovnice (2) pro souřadnice $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ bodu X nadroviny \mathcal{L}_k vztah

$$\mathbf{x} - \mathbf{a} = \sum_{i=1}^k \mathbf{v}_i t_i, \quad \text{neboli} \quad \mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v}_1 t_1 + \mathbf{v}_2 t_2 + \dots + \mathbf{v}_k t_k, \quad t_1, \dots, t_k \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

nebo ve složkách

$$x_r = a_r + v_{1,r} t_1 + v_{2,r} t_2 + \dots + v_{k,r} t_k, \quad r = 1, 2, \dots, n, \quad t_1, t_2, \dots, t_k \in \mathbb{R}.$$

Rovnice (3) se nazývají *parametrické rovnice* nadroviny.

Speciálně, přímka, která prochází bodem A a je rovnoběžná s vektorem $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, je popsána parametrickou rovnicí

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v}t, \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{nebo} \quad x_r = a_r + v_r t, \quad r = 1, 2, \dots, n,$$

a rovina, která prochází bodem A a je rovnoběžná s lineárně nezávislými vektory \mathbf{u} a \mathbf{v} , má parametrické rovnice

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{u}s + \mathbf{v}t, \quad s, t \in \mathbb{R}, \quad \text{tj.} \quad x_r = a_r + u_r s + v_r t, \quad r = 1, 2, \dots, n.$$

Uvedeme ještě jeden popis nadrovin v E_n . Jestliže je v prostoru E_n dáno $(n-1)$ lineárně nezávislých vektorů \mathbf{v}_i , $i = 1, 2, \dots, n-1$, existuje, až na násobek právě jeden nenulový vektor $\mathbf{n} \in V_n$, který je kolmý na všechny vektory \mathbf{v}_k , $k = 1, 2, \dots, n-1$, tj. pro který platí

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_k = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

Jestliže je A bod $(n-1)$ -rozměrné nadroviny \mathcal{L}_{n-1} rovnoběžné s vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$, je pro každý bod $X \in \mathcal{L}_{n-1}$ vektor $X - A$ lineární kombinací vektorů \mathbf{v}_i , a tedy kolmý k vektoru \mathbf{n} . To znamená, že platí

$$\mathbf{n} \cdot (X - A) = 0.$$

Každý takový vektor \mathbf{n} se nazývá *normálový vektor* k nadrovině \mathcal{L}_{n-1} .

Jestliže má bod A souřadnice $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ a normálový vektor souřadnice $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_n)$, platí pro souřadnice $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ bodu X nadroviny \mathcal{L}_{n-1} rovnice

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0, \quad \text{tj.} \quad n_1(x_1 - a_1) + n_2(x_2 - a_2) + \dots + n_n(x_n - a_n) = 0. \quad (4)$$

Pro lineárně nezávislé vektory $\mathbf{v}_r = (v_{r,1}, v_{r,2}, \dots, v_{r,n})$, kde $r = 1, 2, \dots, n-1$, lze formálně sestrojít vektor \mathbf{n} , který je na ně kolmý pomocí determinantu

$$\mathbf{n} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1, & \mathbf{e}_2, & \dots, & \mathbf{e}_n \\ v_{1,1}, & v_{1,2}, & \dots, & v_{1,n} \\ v_{2,1}, & v_{2,2}, & \dots, & v_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n-1,1}, & v_{n-1,2}, & \dots, & v_{n-1,n} \end{pmatrix}. \quad (5)$$

V třírozměrném prostoru se tato operace nazývá *vektorový součin* vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ a budeme jej značit jako

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{e}_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{e}_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{e}_3 = \quad (6)$$

$$= (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

Poznámka: Ve fyzice se v třírozměrném prostoru pro jednotkové vektory ve směru souřadných os používá často značení

$$\mathbf{i} = \mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \mathbf{j} = \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{k} = \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1).$$

Toto značení souvisí s tzv. kvaterniony, s jejichž pomocí můžeme popisovat infinitezimální, tj. "nekonečně malé", rotace kolem souřadných os.

Vektorový součin má následující vlastnosti:

1. pro každé vektory \mathbf{u} a \mathbf{v} je $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$;
2. pro každé vektory \mathbf{u} , \mathbf{v} a \mathbf{w} a $a, b \in \mathbb{R}$ je $(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) \times \mathbf{w} = a\mathbf{u} \times \mathbf{w} + b\mathbf{v} \times \mathbf{w}$;
3. pro každé vektory \mathbf{u} a \mathbf{v} je $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha$, kde α je úhel mezi vektory \mathbf{u} a \mathbf{v} , tj. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ je obsah rovnoběžníka se stranami \mathbf{u} a \mathbf{v} ;
4. pro každé vektory \mathbf{u} , \mathbf{v} a \mathbf{w} je

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Toto rovnost geometricky znamená, že $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ je rovna objemu rovnoběžnostěnu s hranami \mathbf{u} , \mathbf{v} a \mathbf{w} . Speciálně z ní plyne, že vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ je kolmý na vektory \mathbf{u} a \mathbf{v}

5. pro každé vektory \mathbf{u} , \mathbf{v} a \mathbf{w} je $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$.

Je-li v E_n dáno k lineárně nezávislých vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$, existuje právě $(n - k)$ lineárně nezávislých vektorů $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \dots, \mathbf{n}_{n-k}$, které jsou kolmé na každý vektor \mathbf{v}_i , $i = 1, 2, \dots, k$, tj. pro které platí

$$\mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_s = 0, \quad r = 1, 2, \dots, n - k, \quad s = 1, 2, \dots, k.$$

Jestliže je \mathcal{L}_k k -rozměrná nadrovina v E_n , která prochází bodem A a je rovnoběžná s vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$, je pro každý bod X této nadroviny vektor $X - A$ lineární kombinací vektorů $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$. Proto je kolmý ke každému vektoru \mathbf{n}_r , $r = 1, 2, \dots, n - k$ a body této nadroviny \mathcal{L}_k popsat rovnicemi

$$\mathbf{n}_r \cdot (X - A) = 0, \quad r = 1, 2, \dots, n - k.$$

Má-li bod A souřadnice $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ a souřadnice vektorů \mathbf{n}_r , kde $r = 1, 2, \dots, n - k$, jsou $\mathbf{n}_r = (n_{r,1}, n_{r,2}, \dots, n_{r,n})$ je nadrovina \mathcal{L}_k popsána soustavou rovnic

$$\mathbf{n}_r \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0, \quad r = 1, \dots, n - k, \quad (7)$$

neboli

$$n_{r,1}(x_1 - a_1) + n_{r,2}(x_2 - a_2) + \dots + n_{r,n}(x_n - a_n) = 0, \quad r = 1, \dots, n - k.$$

Geometrický význam tohoto popisu je ten, že k -rozměrnou nadrovinu popisujeme jako průnik $(n - k)$ různých $(n - 1)$ -rozměrných nadrovin v E_n , které jsou dány rovnicemi (7).

Jestliže je k -rozměrná nadrovina \mathcal{L}_k v E_n rovnoběžná s lineárně nezávislými vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, nazývá se každý nenulový vektor \mathbf{n} , který je kolmý na všechny vektory \mathbf{v}_i , *normálový vektor* k nadrovině \mathcal{L}_k . Každá přímka, která je rovnoběžná s normálovým vektorem se nazývá *normála* k nadrovině \mathcal{L}_k . Jestliže bod A leží v nadrovině \mathcal{L}_k , je normála k nadrovině \mathcal{L}_k , která prochází bodem A dána parametrickou rovnicí

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{n}t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ke k -rozměrné nadrovině \mathcal{L}_k existuje právě $n - k$ lineárně nezávislých normálových vektorů $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_{n-k}$. Každá $(n - k)$ -rozměrná nadrovina, která je rovnoběžná s lineárně nezávislými normálovými vektory se nazývá *normálová nadrovina* k \mathcal{L}_k . Je-li A daný bod nadroviny \mathcal{L}_k , jsou parametrické rovnice normálové nadroviny, která prochází bodem A

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{n}_1 t_1 + \mathbf{n}_2 t_2 + \dots + \mathbf{n}_{n-k} t_{n-k}, \quad t_1, t_2, \dots, t_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

Z předešlých úvah plyne, že k -rozměrnou nadrovinu \mathcal{L}_k , která prochází bodem A a je rovnoběžná s lineárně nezávislými vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, lze popsat buď pomocí parametrických rovnic

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v}_1 t_1 + \mathbf{v}_2 t_2 + \dots + \mathbf{v}_k t_k, \quad t_1, t_2, \dots, t_k \in \mathbb{R} \quad (8)$$

nebo pomocí řešení soustavy lineárních rovnic

$$\mathbf{n}_r \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0, \quad r = 1, 2, \dots, n - k, \quad (9)$$

kde $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_{n-k}$ jsou lineárně nezávislé normálové vektory k nadrovině \mathcal{L}_k .

Z výše uvedených úvah by mohlo být zřejmé, že parametrický popis nadrovin souvisí s tečnými vektory a popis nadroviny pomocí soustavy lineárních rovnic, tj. jako průnik $(n - 1)$ -rozměrných nadrovin, s normálovými vektory. Později uvidíme, že tento princip platí i pro obecné plochy.

Poznámka. Krátce připomenou vztah mezi těmito dvěma popisy, který by měl být znám z lineární algebry. Snadno nahlédneme, že lineární rovnicí

$$n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_n x_n = b, \quad (10)$$

kde alespoň jedno $n_k \neq 0$, je dána $(n - 1)$ -rozměrná nadrovina \mathcal{L}_{n-1} v E_n , jejíž normálový vektor je $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_n) \neq \mathbf{0}$.

Z lineární algebry by mělo být známo, že obecné řešení $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ rovnice (10) lze zapsat ve tvaru

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v},$$

kde \mathbf{a} je jedno řešení nehomogenní rovnice (10) a \mathbf{v} je obecné řešení homogenní rovnice

$$n_1v_1 + n_2v_2 + \dots + n_nv_n = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (11)$$

Je také známo, že množina všech řešení homogenní rovnice (11) tvoří vektorový prostor. V našem případě je báze v tomto prostoru tvořena $n - 1$ lineárně nezávislými vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$, které jsou kolmé na normálový vektor \mathbf{n} . Obecné řešení lineární rovnice (10) tedy je

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v}_1t_1 + \mathbf{v}_2t_2 + \dots + \mathbf{v}_{n-1}t_{n-1}, \quad t_1, t_2, \dots, t_{n-1} \in \mathbb{R},$$

což je parametrická rovnice $(n - 1)$ -rozměrné nadroviny, která je dána rovnicí (10).

Jestliže je nadrovina dána jako řešení soustavy k lineárních rovnic

$$\begin{aligned} n_{1,1}x_1 + n_{1,2}x_2 + \dots + n_{1,n}x_n &= b_1, & \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{x} &= b_1, \\ n_{2,1}x_1 + n_{2,2}x_2 + \dots + n_{2,n}x_n &= b_2, & \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{x} &= b_2, \\ & \vdots & & \vdots \\ n_{k,1}x_1 + n_{k,2}x_2 + \dots + n_{k,n}x_n &= b_k, & \mathbf{n}_k \cdot \mathbf{x} &= b_k, \end{aligned} \quad \text{tj.} \quad (12)$$

kde $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k$ jsou lineárně nezávislé vektory, je její obecné řešení

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v},$$

kde \mathbf{a} je jedno řešení nehomogenní rovnice (12) a \mathbf{v} je obecné řešení homogenní rovnice

$$\begin{aligned} n_{1,1}v_1 + n_{1,2}v_2 + \dots + n_{1,n}v_n &= \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{v} = 0, \\ n_{2,1}v_1 + n_{2,2}v_2 + \dots + n_{2,n}v_n &= \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{v} = 0, \\ & \vdots \\ n_{k,1}v_1 + n_{k,2}v_2 + \dots + n_{k,n}v_n &= \mathbf{n}_k \cdot \mathbf{v} = 0. \end{aligned} \quad (13)$$

Protože předpokládáme, že jsou normálové vektory lineárně nezávislé, má vektorový prostor řešení bázi tvořenou $(n - k)$ lineárně nezávislými vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-k}$ a obecné řešení soustavy (12) je

$$\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{v}_1t_1 + \mathbf{v}_2t_2 + \dots + \mathbf{v}_{n-k}t_{n-k}, \quad t_1, t_2, \dots, t_{n-k} \in \mathbb{R},$$

tj. parametrické rovnice $(n - k)$ -rozměrné nadroviny.

Naopak od parametrického popisu nadroviny (8) přejdeme k jejímu popisu pomocí soustavy rovnic (9) tak, že z rovnic (8) vyloučíme parametry t_1, t_2, \dots, t_k . To lze udělat tak, že najdeme $(n - k)$ lineárně nezávislých vektorů \mathbf{n}_r , $r = 1, 2, \dots, n - k$, které jsou kolmé na vektory \mathbf{v}_s , $s = 1, 2, \dots, k$, tj. pro každé r a s platí $\mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_s = 0$. Když napíšeme parametrické rovnice (8) ve tvaru

$$\mathbf{x} - \mathbf{a} = \mathbf{v}_1t_1 + \mathbf{v}_2t_2 + \dots + \mathbf{v}_kt_k,$$

je ihned vidět, že pro každé $r = 1, 2, \dots, n - k$, platí

$$\mathbf{n}_r \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_1t_1 + \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_2t_2 + \dots + \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_kt_k = 0,$$

což je soustava rovnic (9), která popisuje danou nadrovinu.

Zobrazení intervalu $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ do \mathbb{R}^n a parametrické rovnice křivky

Ukázali jsme, že když zvolíme kartezský systém souřadnic \mathfrak{S} , lze euklidovský prostor E_n ztotožnit s prostorem \mathbb{R}^n , který budeme chápat jako vektorový prostor se skalárním součinem, kde pro $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ a $a \in \mathbb{R}$ je

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n), \quad a\mathbf{x} = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n), \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Zobrazení $\mathbf{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$, kde \mathcal{I} je interval v \mathbb{R} , lze chápat jako zobrazení intervalu \mathcal{I} do euklidovského prostoru E_n . Pak je každému bodu $t \in \mathcal{I}$ přiřazen právě jeden bod $X \in E_n$. Za jistých předpokladů o zobrazení \mathbf{f} jako je například spojitost, můžeme takové zobrazení geometricky interpretovat jako parametrické rovnice křivky \mathcal{C} v E_n .

Tyto rovnice budeme psát jako

$$\mathbf{x} = \mathbf{f}(t) = \mathbf{x}(t), \quad \text{kde } t \in \mathcal{I}. \quad (14)$$

Pomocí souřadnic jsou rovnice (14)

$$x_i = x_i(t), \quad \text{kde } t \in \mathcal{I}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Definice. Nechť je $\mathbf{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ a t vnitřní bod množiny \mathcal{I} . Pokud existuje $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^n$ takové, že

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{f}(t+h) - \mathbf{f}(t) - \mathbf{A}h\|}{h} = 0, \quad (15)$$

nazývá se zobrazení \mathbf{f} *diferencovatelné* v bodě t a lineární vektorová funkce proměnné h definovaná jako

$$d\mathbf{f}(t; h) = \mathbf{A}h$$

se nazývá *diferenciál zobrazení \mathbf{f}* v bodě t .

Poznámka. Z rovnice (15) plyne $\mathbf{A} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(t+h) - \mathbf{f}(t)}{h}$.

Definice. Pokud existuje limita

$$\mathbf{f}'(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(t+\Delta) - \mathbf{f}(t)}{\Delta} = \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t), \quad (16)$$

nazývá se *derivace zobrazení $\mathbf{f}(t)$* v bodě t .

Podobně jako pro funkci jedné reálné proměnné platí

Věta. Zobrazení $\mathbf{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je diferencovatelné v bodě t právě tehdy, když existuje derivace $\mathbf{f}'(t)$ a jeho diferenciál je

$$d\mathbf{f}(t, h) = \mathbf{f}'(t) h.$$

Jestliže napíšeme (16) pomocí složek, dostaneme

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'(t) &= \left(\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f_1(t+\Delta) - f_1(t)}{\Delta}, \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f_2(t+\Delta) - f_2(t)}{\Delta}, \dots, \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f_n(t+\Delta) - f_n(t)}{\Delta} \right) = \\ &= (f'_1(t), f'_2(t), \dots, f'_n(t)). \end{aligned}$$

Tedy derivace zobrazení $\mathbf{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ najdeme tak, že derivujeme každou jeho složku.

Geometrická interpretace derivace zobrazení intervalu $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ do \mathbb{R}^n .

Jestliže zobrazení $\mathbf{x} = \mathbf{f}(t) = \mathbf{x}(t)$, kde $t \in (a, b)$, interpretujeme jako parametrické rovnice křivky $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ a $t_0 \in (a, b)$, leží body $\mathbf{x}(t_0)$ a $\mathbf{x}(t_0 + \Delta)$ na křivce \mathcal{C} . Přímka, která prochází těmito body, je rovnoběžná s vektorem

$$\mathbf{x}(t_0 + \Delta) - \mathbf{x}(t_0) \sim \frac{\mathbf{x}(t_0 + \Delta) - \mathbf{x}(t_0)}{\Delta}.$$

Z geometrického pohledu přejde pro $\Delta \rightarrow 0$ tato přímka v tečnu ke křivce \mathcal{C} v jejím bodě $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$. Proto je vektor

$$\boldsymbol{\tau} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t_0 + \Delta) - \mathbf{x}(t_0)}{\Delta} = \mathbf{x}'(t_0) \quad (17)$$

tečný vektor ke křivce \mathcal{C} v bodě \mathbf{x}_0 a parametrické rovnice tečny ke křivce \mathcal{C} v tomto bodě jsou

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{x}'(t_0) s, \quad s \in \mathbb{R}. \quad (18)$$

Poznámka. Aby byly parametrické rovnice (18) skutečně parametrické rovnice přímky, musíme předpokládat, že je vektor $\mathbf{x}'(t_0)$ nenulový. Pokud je $\mathbf{x}'(t_0) = 0$ neznámá to ještě, že křivka \mathcal{C} nemá v bodě $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$ tečnu. Může se totiž stát, že když budeme křivku \mathcal{C} popisovat jinými parametrickými rovnicemi, dostaneme v tomto bodě nenulovou derivaci, a tedy nenulový tečný vektor. Proto se budeme při popisu křivky pomocí parametrických rovnic $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ bodům, ve kterých je $\mathbf{x}'(t) = 0$ vyhýbat.

Fyzikální interpretace derivace zobrazení intervalu $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ do \mathbb{R}^n .

Budeme-li považovat proměnnou t za čas, můžeme interpretovat zobrazení $t \mapsto \mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ jako pohyb bodu X v prostoru $E_n \sim \mathbb{R}^n$. Pak jsou $\mathbf{x}(t)$, resp. $\mathbf{x}(t + \Delta)$, polohy bodu X v čase t , resp. $t + \Delta$. Vektor

$$\bar{\mathbf{v}}(t, \Delta) = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta) - \mathbf{x}(t)}{\Delta}$$

pak interpretujeme jako průměrný vektor rychlosti bodu X v intervalu $(t, t + \Delta)$. Limita $\Delta \rightarrow 0$ pak dává vektor rychlosti bodu X v čase t , tj.

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta) - \mathbf{x}(t)}{\Delta} = \mathbf{x}'(t). \quad (19)$$

Z podobných důvodů se ve fyzice interpretuje druhá derivace zobrazení $\mathbf{x}(t)$ v čase t jako zrychlení $\mathbf{a}(t)$ bodu X , tj.

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{x}''(t).$$