


# PŘEDNÁŠKA 5

VĚTY O STŘEDNÍ

HODNOTĚ

## Věty o střední hodnotě

**Věta (Rolle).** *Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném omezeném intervalu  $\langle a, b \rangle$  a má derivaci v každém bodě otevřeného intervalu  $(a, b)$ , nechť platí  $f(a) = f(b)$ . Pak existuje alespoň jeden bod  $\xi \in (a, b)$  takový, že  $f'(\xi) = 0$ .*



**Důkaz.** Je-li funkce  $f$  konstantní, je tvrzení zřejmé. Není-li konstantní, pak podle Weierstrassovy věty existuje bod  $\xi \in (a, b)$  tak, že číslo  $f(\xi)$  je maximem nebo minimem funkce na intervalu  $\langle a, b \rangle$ . Předpokládejme nejprve, že toto číslo je maximem. Pokud by bylo


$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0,$$

existovalo by takové okolí  $P(x_0, \delta)$ , že

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \text{pro všechna } x \in P(x_0, \delta).$$

Pak by bylo  $f(x) > f(x_0)$  pro všechna  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ , což je spor s předpokladem, že  $f$  nabývá v bodě  $x_0$  maxima. Analogicky v ostatních případech.

**Věta (Lagrange).** *Nechť je funkce  $f$  spojitá na uzavřeném omezeném intervalu  $\langle a, b \rangle$  a má derivaci v každém bodě otevřeného intervalu  $(a, b)$ . Pak existuje aspoň jeden bod  $\xi \in (a, b)$  takový, že  $f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a)$ .*



**Důkaz.** Stačí aplikovat Rolleovu větu na funkci

$$h(x) = (f(x) - f(a))(b - a) - (f(b) - f(a))(x - a).$$

☞ **Příklad.** Dokažte, že pro každé  $x \geq 0$  platí nerovnost  $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$ , kde  $\alpha$  je libovolné číslo z intervalu  $(0, 1)$ .

**Řešení.** Označme

$$f(x) = 1 + \alpha x - (1+x)^\alpha;$$

funkce  $f$  je na intervalu  $\langle 0, +\infty \rangle$  spojitá a má zde derivaci

$$f'(x) = \alpha - \alpha(1+x)^{\alpha-1} > 0.$$

Navíc platí  $f(0) = 0$ . Nechť je  $x \in (0, +\infty)$ . Podle Lagrangeovy věty existuje takový bod  $\xi \in (0, x)$ , že

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi) \cdot (x - 0) > 0.$$

Tedy pro každé  $x \in (0, +\infty)$  je  $f(x) > 0$ .

**Důsledek.** *Nechť funkce  $f$  je spojitá v intervalu  $\langle a, b \rangle$  a nechť v každém vnitřním bodě  $x$  intervalu  $\langle a, b \rangle$  má derivaci  $f'(x) = 0$ . Pak tato funkce je v intervalu  $\langle a, b \rangle$  konstantní.*

**Důkaz.** Zvolme bod  $c \in \langle a, b \rangle$ . Pak pro každý bod  $x \in \langle a, b \rangle$  podle Lagrangeovy věty existuje bod  $\xi \in (a, b)$  takový, že  $f(x) - f(c) = f'(\xi)(x - c) = 0$ . Tedy  $f(x) = f(c)$  pro každé  $x \in \langle a, b \rangle$ .

☞ **Příklad.** Ukažte, že na intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  platí rovnost

$$\arcsin x + \arccos x = \pi/2.$$

**Řešení.**

$$(\arcsin x + \arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0,$$

podle důsledku 1 je funkce  $\arcsin x + \arccos x$  konstantní. Nyní stačí najít její hodnotu v libovolném bodě, např. v bodě  $x = 0$  :  $\arcsin 0 + \arccos 0 = \pi/2$  .

**Věta (Cauchy).** *Nechť jsou funkce  $f, g$  spojité na uzavřeném omezeném intervalu  $\langle a, b \rangle$ , diferencovatelné na otevřeném intervalu  $(a, b)$  a pro každé  $x \in (a, b)$  je  $g'(x) \neq 0$ . Pak existuje bod  $\xi \in (a, b)$  takový, že*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

**Důkaz.** Z podmínky  $g'(x) \neq 0$  pro všechna  $x \in (a, b)$  a z Rolleovy věty plyne, že  $g(b) \neq g(a)$ . Označme

$$F(x) = (f(x) - f(a)) \cdot (g(b) - g(a)) - (f(b) - f(a)) \cdot (g(x) - g(a)).$$

$F(a) = F(b) = 0$ ,  $F$  je spojitá na  $\langle a, b \rangle$ , diferencovatelná na  $(a, b)$ . Podle Rolleovy věty existuje  $\xi \in (a, b)$ , pro které

$$F'(\xi) = f'(\xi) \cdot (g(b) - g(a)) - (f(b) - f(a)) \cdot g'(\xi) = 0.$$

Zbytek plyne z  $g(b) - g(a) \neq 0$  a  $g'(\xi) \neq 0$ .

**Věta (L'Hospitalovo pravidlo).** *Nechť  $a \in \mathbb{R}^*$  a nechť*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \text{ resp. } \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty.$$

*Existuje-li  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ , pak existuje také  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  a platí*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

*Analogické tvrzení platí pro jednostranné limity.*

☞ **Příklad.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$



**Důkaz.** Pro limity zprava.

Z existence limity

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

plyne existence takového pravého okolí  $(a, x_1)$  bodu  $a$ , že na intervalu  $\langle a, x_1 \rangle$  jsou splněny předpoklady Cauchyovy věty.

Je-li  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ , můžeme předpokládat, že  $f(a) = g(a) = 0$ . Kdyby funkce v bodě  $a$  nebyly definovány, spojitě je dodefinujeme těmito nulovými hodnotami. Podle Cauchyovy věty pak pro každé  $x \in (a, x_1)$  existuje  $\xi \in (a, x)$  tak, že

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Odtud již poměrně snadno plyne dokazovaná existence limity a rovnost limit.

Nechť je nyní  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$ ; nemůžeme pracovat s hodnotami funkcí v bodě  $a$ , pro každé  $x \in (a, x_1)$  však můžeme aplikovat Cauchyovu větu na interval  $\langle x, x_1 \rangle$ . Podle ní existuje bod  $\xi \in (x, x_1)$  tak, že

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Odtud

$$f(x) - f(x_1) = (g(x) - g(x_1)) \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

a po vydělení obou stran hodnotou  $g(x)$  dostaneme rovnost

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_1)}{g(x)} + \left(1 - \frac{g(x_1)}{g(x)}\right) \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Pomocí této rovnosti lze již dokázat jak existenci limity, tak i potřebnou rovnost.

☞ **Příklad.**

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left( \frac{+\infty}{+\infty} \right) =$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{1} = 0$$

$$(d) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \left( \frac{+\infty}{+\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

(e) Pro libovolné  $k \in \mathbb{N}$  :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^k} = \left( \frac{+\infty}{+\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{kx^{k-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{k!} = \infty$$

$$(f) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \ln \frac{1}{x} \right)^{x^2} = ((-\infty)^0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x^2 \ln \frac{1}{x}} = (e^{0 \cdot (-\infty)})$$

Protože

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \frac{1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \left( \frac{-\infty}{+\infty} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \left( -\frac{1}{x^2} \right)}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{2} = 0, \end{aligned}$$

$$\text{je } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \ln \frac{1}{x} \right)^{x^2} = e^0 = 1$$