

# Přednáška 11

## Nevlastní Riemannův integrál

V minulé přednášce jsme se zabývali určitým integrálem. Definovali jsme Newtonův integrál funkce  $f(x)$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$  vztahem

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a), \quad (1)$$

kde  $F(x)$  je primitivní funkce k funkci  $f(x)$  na intervalu  $\langle a, b \rangle$ , a Riemannův integrál jako obsah plochy pod grafem funkce  $y = f(x) \geq 0$ . Zjistili jsme, že pro spojité funkce na intervalu  $\langle a, b \rangle$  jsou obě definice stejné.

Ale může se stát, že jeden z těchto integrálů existuje a druhý ne. Nevýhoda Newtonova integrálu je v tom, že musí existovat primitivní funkce k funkci  $f(x)$ . Hlavní nevýhoda Riemannova integrálu spočívá v tom, že jsme se při jeho definici museli omezit na omezené intervaly  $\langle a, b \rangle$  a omezené funkce. V této přednášce budeme definovat o něco obecnější nevlastní (neboli zobecněný) Riemannův integrál, který tyto problémy částečně odstraní.

Nejprve na příkladu ukážeme, jak lze odstranit předpoklad, že funkce  $f(x)$  je omezená.

**Příklad:** Po každé  $b \in (0, 1)$  je definován Riemannův integrál

$$\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = [-2\sqrt{1-x}]_0^b = -2\sqrt{1-b} + 2.$$

Tento integrál vyjadřuje velikost plochy pod grafem funkce  $y = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$  mezi body  $x = 0$  a  $x = b \in (0, 1)$ . Protože existuje konečná limita

$$\lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{b \rightarrow 1^-} (-2\sqrt{1-b} + 2) = 2,$$

je přirozené, považovat toto číslo za obsah plochy pod grafem funkce  $y = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$  mezi body  $x = 0$  a  $x = 1$ .

Na druhou stranu je pro každé  $b \in (0, 1)$  je definován Riemannův integrál

$$\int_0^b \frac{dx}{1-x} = [-\ln(1-x)]_0^b = -\ln(1-b).$$

Ale v tomto případě je

$$\lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{1-x} = \lim_{b \rightarrow 1^-} (-\ln(1-b)) = +\infty$$

a obsah plochy pod grafem funkce  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  od bodu  $x = 0$  do bodu  $x = 1$  není konečný.

Na tomto příkladě je vidět, že existují neomezené funkce, pro které lze definovat obsah plochy pod jejím grafem. Proto je přirozené rozšířit definici Riemannova integrálu na takové funkce.

**Definice.** Nechť pro každé  $y \in (a, b)$  existuje Riemannův integrál  $\int_a^y f(x) dx$ . Jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{y \rightarrow b^-} \int_a^y f(x) dx,$$

nazýváme ji nevlastní Riemannův integrál funkce  $f(x)$  od bodu na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .

Nechť pro každé  $y \in (a, b)$  existuje Riemannův integrál  $\int_y^b f(x) dx$ . Jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{y \rightarrow a^+} \int_y^b f(x) dx,$$

nazýváme ji nevlastní Riemannův integrál funkce  $f(x)$  od bodu na intervalu  $\langle a, b \rangle$ .

Jestliže existuje nevlastní integrál, říkáme, že integrál *konverguje*. V opačném případě říkáme, že integrál *diverguje*.

Nevlastní Riemannovy integrály budeme značit stejným symbolem  $\int_a^b f(x) dx$  jako obyčejné Riemannovy integrály. Platí totiž

**Věta.** Pokud existuje Riemannův integrál  $\int_a^b f(x) dx$ , rovná se nevlastnímu Riemannovu integrálu.

**Příklad:** Najděte hodnoty  $p \in \mathbb{R}$ , pro které konverguje integrál  $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ .

**Řešení:** Pro každé  $y \in (0, 1)$  je

$$\int_y^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1 - y^{1-p}}{1-p} & \text{pro } p \neq 1, \\ -\ln y & \text{pro } p = 1. \end{cases} \quad (2)$$

Jestliže v (2) přejdeme k limitě  $y \rightarrow 0_+$ , dostaneme

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_y^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & \text{pro } p < 1, \\ +\infty & \text{pro } p \geq 1. \end{cases}$$

Integrál  $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$  tedy konverguje pro  $p < 1$ .

Podobně lze odstranit i předpoklad omezeného intervalu. I v tomto případě požadujeme, aby integrál nabýval pouze konečných hodnot.

**Definice.** Nechť pro každé  $y > a$  existuje Riemannův integrál  $\int_a^y f(x) dx$ . Jestliže existuje konečná limita

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^y f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

nazýváme ji *nevlastní Riemannův integrál*.

Nechť pro každé  $y < a$  existuje Riemannův integrál  $\int_y^a f(x) dx$ . Jestliže existuje konečná limita

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^a f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx,$$

nazýváme ji *nevlastní Riemannův integrál*.

Jestliže existuje nevlastní integrál, říkáme, že integrál *konverguje*. V opačném případě říkáme, že integrál *diverguje*.

**Příklad:** Najděte množinu všech  $p \in \mathbb{R}$ , pro která konverguje integrál  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ .

**ŘEŠENÍ:** Pro každé  $y > 1$  je

$$\int_1^y \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{y^{1-p} - 1}{1-p} & \text{pro } p \neq 1, \\ \ln y & \text{pro } p = 1. \end{cases} \quad (3)$$

Jestliže přejdeme k limitě  $y \rightarrow +\infty$ , dostaneme

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & \text{pro } p > 1, \\ +\infty & \text{pro } p \leq 1. \end{cases}$$

Integrál  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$  tedy konverguje pro  $p > 1$ .

Zatím jsme definovali nevlastní Riemannův integrál pouze v případě, kdy nám vadil jenom jeden bod, který byl krajním bodem integračního oboru. V následujících příkladech ukážeme, jak se postupuje v obecném případě.

**Příklad:** V integrálu  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$  není integrovaná funkce omezená v okolí bodu  $x = 0$ , který leží uvnitř intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$ . Je přirozené, rozdělit tímto bodem interval  $\langle -1, 1 \rangle$  na dva intervaly a definovat

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}} + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}},$$

kde oba integrály na pravé straně jsou již nevlastní Riemannovy integrály ve smyslu dříve uvedených definic.

**Příklad:** V integrálu  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)(x-2)}}$  nám vadí body  $x = 0$ ,  $x = 1$  a  $x = 2$ , které jsou uvnitř intervalu, a body  $\pm\infty$ . Při výpočtu takového integrálu je přirozené zvolit body  $a_1 \in (-\infty, 0)$ ,  $a_2 \in (0, 1)$ ,  $a_3 \in (1, 2)$  a  $a_4 \in (2, +\infty)$  a definovat

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{a_1} f(x) dx + \int_{a_1}^0 f(x) dx + \int_0^{a_2} f(x) dx + \int_{a_2}^1 f(x) dx + \\ &+ \int_1^{a_3} f(x) dx + \int_{a_3}^2 f(x) dx + \int_2^{a_4} f(x) dx + \int_{a_4}^{+\infty} f(x) dx, \end{aligned}$$

kde  $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)(x-2)}}$ . V tomto vztahu jsou na pravé straně opět nevlastní integrály, které jsme definovali dříve.

Aby na pravé straně této rovnosti nebyly výrazy typu  $\infty - \infty$ , omezili jsme se při definici nevlastních Riemannových integrálů na vlastní limity. Celý integrál pak konverguje právě tehdy, když konvergují všechny integrály vpravo.

**Definice.** Necht' existují body  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  takové, že  $a = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$ , a pro každé  $k = 1, 2, \dots, n$  existuje nevlastní integrál  $\int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x) dx$  ve smyslu výše uvedených definic. Pak číslo

$$\sum_{k=1}^n \int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

nazýváme nevlastním Riemannovým integrálem od bodu  $a$  do bodu  $b$ .

## Konvergence nevlastního integrálu

Většinou nás až tak nebude zajímat hodnota nevlastního Riemannova integrálu, ale to, jestli integrál konverguje nebo diverguje. Věty, které nyní uvedeme, jsou velmi podobné větám o konvergenci číselných řad.

**Věta.** Existuje-li  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ , pak nevlastní integrál  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  diverguje.

**Věta.** Jestliže je funkce  $f(x)$  na intervalu  $(a, +\infty)$  spojitá a  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  konverguje, je  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**Věta.** Jestliže konverguje integrál  $\int_a^b |f(x)| dx$ , konverguje také integrál  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Definice.** Jestliže konverguje integrál  $\int_a^b |f(x)| dx$ , nazývá se integrál  $\int_a^b f(x) dx$  *absolutně konvergentní*.

Jestliže konverguje integrál  $\int_a^b f(x) dx$  a integrál  $\int_a^b |f(x)| dx$  diverguje, nazývá se integrál  $\int_a^b f(x) dx$  *neabsolutně konvergentní*.

## Konvergence integrálu nezáporné funkce

Podobně jako u číselných řad je podstatně snazší rozhodnout o absolutní konvergenci integrálu. Je-li totiž  $f(x) \geq 0$ , je funkce  $F(y) = \int_a^y f(x) dx$  neklesající, a proto vždy existuje

$$\lim_{y \rightarrow b^-} F(y) = \sup_{y \in (a,b)} F(y).$$

Tedy nevlastní Riemannův integrál nezáporné funkce  $f(x)$  existuje právě tehdy, když je funkce  $F(y) = \int_a^y f(x) dx$  na intervalu  $(a, b)$  omezená.

Z toho plynou další kritéria konvergence nevlastních integrálů nezáporných funkcí. V těchto větách budeme mlčky předpokládat, že pro každé  $y \in (a, b)$  existuje Riemannův integrál  $\int_a^y f(x) dx$ . To je splněno například tehdy, když je funkce  $f(x)$  na intervalu  $(a, b)$  spojitá nebo monotonní.

**Věta (srovnávací kritérium).** Nechť pro každé  $x \in (a, b)$  platí  $0 \leq g(x) \leq f(x)$ .

Konverguje-li integrál  $\int_a^b f(x) dx$ , konverguje také integrál  $\int_a^b g(x) dx$ .

Diverguje-li integrál  $\int_a^b g(x) dx$ , diverguje také integrál  $\int_a^b f(x) dx$ .

DŮKAZ: Pro každé  $y \in (a, b)$  platí nerovnost

$$0 \leq \int_a^y g(x) dx \leq \int_a^y f(x) dx.$$

Jestliže konverguje integrál  $\int_a^b f(x) dx$ , je funkce  $G(y) = \int_a^y g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$ , a tedy je omezená.

Jestliže diverguje integrál  $\int_a^b g(x) dx$ , je funkce  $F(y) = \int_a^y f(x) dx \geq \int_a^y g(x) dx$ , a tedy není omezená.

Jako příklad použití tohoto kritéria uvedeme integrální kritérium konvergence číselných řad.

**Věta (integrální kritérium konvergence řad).** Je-li  $f(x)$  nezáporná monotonní funkce na intervalu  $(1, +\infty)$ , pak integrál  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  a číselná řada  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  současně konvergují nebo divergují.

DŮKAZ: Je-li funkce  $f(x)$  rostoucí, existuje limita  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$  a řada i integrál divergují.

Nechť je funkce  $f(x)$  nerostoucí. Definujeme funkce  $f_1(x) = f(n+1)$  pro  $x \in \langle n, n+1 \rangle$  a  $f_2(x) = f(n)$  pro  $x \in \langle n, n+1 \rangle$ , kde  $n \in \mathbb{N}$ . Protože je funkce  $f(x)$  nerostoucí, platí pro každé  $x \in (1, +\infty)$  nerovnost  $f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x)$ . Integrací pak dostaneme pro každé  $N \in \mathbb{N}$  nerovnosti

$$\int_1^N f_1(x) dx \leq \int_1^N f(x) dx \leq \int_1^N f_2(x) dx.$$

A jestliže si uvědomíme, že platí

$$\int_1^N f_1(x) dx = \sum_{n=2}^{N+1} f(n), \quad \int_1^N f_2(x) dx = \sum_{n=1}^N f(n),$$

získáme pro každé  $N \in \mathbb{N}$  nerovnost

$$\sum_{n=2}^{N+1} f(n) \leq \int_1^N f(x) dx \leq \sum_{n=1}^N f(n),$$

ze které už snadno plyne, že funkce  $F(y) = \int_1^y f(x)$  je omezená právě tehdy, když je omezená posloupnost  $s_N = \sum_{n=1}^N f(n)$ .

Je zřejmé, že konvergence nevlastního integrálu závisí pouze chování integrované funkce v okolí bodu, kde neexistuje její Riemannův integrál. Abychom rozhodli o konvergenci nebo divergenci nevlastního integrálu často srovnáváme integrovanou funkci v okolí tohoto bodu s funkcí, o které víme, že její nevlastní integrál konverguje nebo diverguje. Přesněji platí následující věta.

**Věta.** Necht' jsou  $f(x)$  a  $g(x)$  nezáporné funkce a pro každé  $y \in (a, b)$  existují Riemannovy integrály  $\int_a^y f(x) dx$  a  $\int_a^y g(x) dx$ . Jestliže existuje konečná limita  $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ , pak integrály  $\int_a^b f(x) dx$  a  $\int_a^b g(x) dx$  současně konvergují nebo divergují.

Abychom mohli používat tuto větu, musíme mít jistou zásobu funkcí, o nichž víme, že jejich nevlastní integrály konvergují nebo divergují. Pak srovnáváme daný integrál s těmito známými integrály. Pro konvergenci v nekonečnu se používá integrál

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad \text{který} \quad \begin{cases} \text{konverguje pro } p > 1 \\ \text{diverguje pro } p \leq 1 \end{cases} \quad (4)$$

a pro konvergenci v konečném bodě  $x = a$  integrál

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}, \quad \text{který} \quad \begin{cases} \text{konverguje pro } p < 1 \\ \text{diverguje pro } p \geq 1. \end{cases} \quad (5)$$

**Příklad:** Zkoumejte konvergenci integrálu  $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt[4]{x^3 + 2x + 1} dx}{\sqrt[3]{x^2 + 1} \sqrt[5]{x^6 + x^4 + x^2 + 1}}$ .

**Řešení:** Integrovaná funkce je na intervalu  $(1, +\infty)$  omezená a spojitá. Proto pro každé  $y \in (1, +\infty)$  existuje její Riemannův integrál. Pro velká  $x$  je

$$f(x) = \frac{\sqrt[4]{x^3 + 2x + 1}}{\sqrt[3]{x^2 + 1} \sqrt[5]{x^6 + x^4 + x^2 + 1}} \approx \frac{x^{3/4}}{x^{2/3} x^{6/5}} = \frac{1}{x^{67/60}}.$$

Protože  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{-67/60}} = 1$ , konverguje uvedený integrál současně s integrálem  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{67/60}}$ , který konverguje podle (4). Tedy uvedený integrál konverguje.

**Příklad:** Zkoumejte konvergenci integrálu  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3} \sqrt[3]{x^3-3x+2}}$ .

**Řešení:** Protože

$$1 - x^3 = (1-x)(1+x+x^2) \quad \text{a} \quad x^3 - 3x + 2 = (1-x)^2(2+x),$$

je jediný bod, kde není integrovaná funkce na intervalu  $(0, 1)$  omezená, bod  $x = 1$ . Integrovanou funkci lze psát ve tvaru

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^3} \sqrt[3]{x^3-3x+2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x+x^2}} \frac{1}{(1-x)^{1/2}} \frac{1}{\sqrt[3]{2+x}} \frac{1}{(1-x)^{2/3}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x+x^2}} \frac{1}{\sqrt[3]{2+x}} \frac{1}{(1-x)^{7/6}}. \end{aligned}$$

Z toho je vidět, že

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{(1-x)^{-7/6}} = \frac{1}{\sqrt{3} \sqrt[3]{3}}.$$

Proto uvedený integrál konverguje právě tehdy, když konverguje integrál  $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{7/6}}$ , který podle (5) diverguje. Tedy uvedený integrál diverguje.

Jestliže existuje více bodů, v jejichž okolí neexistuje integrál jako Riemannův, rozdělíme interval na několik dílčích intervalů a vyšetřujeme konvergenci integrálu na každém intervalu zvlášť. Aby integrál konvergoval na celém intervalu, musí konvergovat na každém z dílčích intervalů.

**Příklad:** V závislosti na hodnotě parametru  $p \in \mathbb{R}$  vyšetřujte konvergenci nevlastního Riemannova integrálu  $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x \, dx}{x^p}$ .

**ŘEŠENÍ:** Protože je funkce  $f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^p}$  na intervalu  $(0, +\infty)$  spojitá mohou nastat problémy v bodě  $x = +\infty$ , tam určitě, a v bodě  $x = 0$ , pokud nebude v okolí tohoto bodu funkce  $f(x)$  omezená. Proto napíšeme

$$\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x \, dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x \, dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x \, dx}{x^p}.$$

Protože je  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{1}{2}\pi$ , konverguje druhý integrál současně s integrálem  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ .

Podle (4) tedy musí být  $p > 1$ .

Protože je  $\operatorname{arctg} 0 = 0$  je situace v prvním integrálu trochu složitější. Jestliže nahradíme funkci  $\operatorname{arctg} x$  v okolí bodu  $x = 0$  prvním nenulovým členem Taylorova rozvoje, tj. napíšeme  $\operatorname{arctg} x \sim x$ , dostaneme v okolí bodu  $x = 0$  vztah

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x^p} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}}.$$

Protože

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{-p+1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1,$$

konverguje první integrál současně s integrálem  $\int_0^1 \frac{dx}{x^{p-1}}$ . Podle (5) musí tedy být  $p-1 < 1$ , tj.  $p < 2$ .

Celkově tedy integrál  $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x \, dx}{x^p}$  konverguje pro  $1 < p < 2$ .

## Absolutní a neabsolutní konvergence integrálu

Jestliže funkce  $f(x)$  není nezáporná, vyšetřujeme nejprve absolutní konvergenci integrálu  $\int_a^b f(x) dx$ , tj. konvergenci integrálu  $\int_a^b |f(x)| dx$ , na který už můžeme použít uvedená kritéria pro konvergenci integrálů nezáporné funkce.

Nekonverguje-li integrál  $\int_a^b f(x) dx$  absolutně, je situace, stejně jako tomu bylo u řad, podstatně složitější. Uvedeme aspoň jeden příklad.

**Příklad:** Necht' je  $0 < p < 1$ . Dokažte, že nevlastní integrál  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x dx}{x^p}$  konverguje.

**ŘEŠENÍ:** Pro každé  $y > 0$  platí

$$\int_0^y \frac{\sin x dx}{x^p} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x dx}{x^p} + \int_{\pi/2}^y \frac{\sin x dx}{x^p}.$$

Protože je  $0 < p < 1$ , je funkce  $f(x) = \frac{\sin x}{x^p}$  na intervalu  $(0, \frac{1}{2}\pi)$  omezená, první integrál je obyčejný Riemannův integrál spojitě funkce, a tedy konverguje.

Ve druhém integrálu použijeme integraci per partes a dostaneme

$$\int_{\pi/2}^y \frac{\sin x dx}{x^p} = \left[ \frac{-\cos x}{x^p} \right]_{\pi/2}^y - p \int_{\pi/2}^y \frac{\cos x dx}{x^{p+1}} = -\frac{\cos y}{y^p} - p \int_{\pi/2}^y \frac{\cos x dx}{x^{p+1}}.$$

Protože  $p > 0$ , je  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\cos y}{y^p} = 0$ . Dále platí nerovnost

$$\left| \frac{\cos x}{x^{p+1}} \right| \leq \frac{1}{x^{p+1}}.$$

A protože je  $p + 1 > 1$ , je podle (5) poslední integrál konvergentní.

Obecně platí pro neabsolutně konvergentní integrály následující věta, jejíž důkaz využívá druhé věty o střední hodnotě nebo integrace per partes podobně jako v předchozím příkladu.

**Věta (Dirichletovo kritérium).** Necht' je  $f(x)$  spojitá funkce a  $g(x)$  je nezáporná spojitě diferencovatelná nerostoucí funkce na intervalu  $(a, +\infty)$  a platí  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ . Necht' je

funkce  $F(y) = \int_a^z f(x) dx$  omezená na intervalu  $(a, +\infty)$ . Pak integrál  $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$  konverguje.

Toto kritérium bylo možné aplikovat v předešlém příkladě na druhý integrál, kde bychom vzali  $f(x) = \sin x$  a  $g(x) = \frac{1}{x^p}$ ,  $0 < p < 1$ .